


**Fiche Prélèvement / Suspicion GRIPPE AVIAIRE****3 REALISATION D'UN PRELEVEMENT A VISEE DIAGNOSTIQUE**

Dans tous les cas, lors de ces prélèvements, les professionnels de santé doivent respecter strictement l'application des mesures d'hygiène, précautions complémentaires de type « air et contact renforcées » (L'opérateur doit porter un masque FFP2, une cagoule chirurgicale, des lunettes de protection, une surblouse étanche (à défaut, une surblouse et un tablier en plastique), des gants à usage unique).

Ecouvillonnage naso-pharyngé

1. Demander au patient de tousser dans son masque puis d'abaisser son masque
2. Demander au patient de garder la tête droite, de se détendre, de ne pas crisper le visage, d'essayer de maintenir une expression neutre pendant toute la procédure. Lui expliquer la procédure (elle est désagréable, dure 2-3 secondes), le rassurer
3. Sortir le tube de transport et l'écouvillon stérile de leur étui.
4. Introduire l'écouvillon nasopharyngé à travers une narine, en parallèle au plancher buccal. Il faut introduire l'écouvillon d'environ 5 cm, le but est d'atteindre la paroi pharyngée postérieure
5. Sur la paroi pharyngée postérieure, appliquer 2-3 mouvements de rotation douce puis retirer l'écouvillon. Si le patient pleure, l'écouvillon a été fait au bon endroit
6. Demander au patient de remettre son masque chirurgical (il devra ensuite se frictionner les mains à la SHA)
7. Dévisser puis enlever aseptiquement le bouchon du tube de transport ou similaire en veillant à ne pas faire sortir le milieu de transport.
8. Insérer l'écouvillon dans le tube jusqu'au niveau du trait rouge qui indique le point de rupture optimal de la tige.
9. Rompre la tige, en gardant le tube loin du visage. Le bout de l'écouvillon imbibé de prélèvement tombe alors au fond tube de transport.



10. Enfoncer l'écouvillon cassé en « tir bouchon » à l'aide du bouchon
11. Remettre le bouchon sur le tube et bien visser.
12. Décontaminer le tube (en cas de souillure du dispositif) avec un agent désinfectant selon protocole local
13. Identifier le tube avec l'étiquette du patient.
14. Eliminer le manche brisé de la tige de l'écouvillon dans un récipient destiné à l'élimination des déchets.