

Hôpital de la Croix-Rousse
Centre de Biologie Nord- Bât O
Institut des Agents Infectieux
103 Grande Rue de la Croix Rousse
69317 LYON Cedex 04

Directeur : Dr. Anne Tristan
Co-directeurs : Pr. Frédéric Laurent
Pr. François Vandenesch
Tél standard IAI : (33) 04 72 07 11 11
Fax : (33) 04 72 07 18 42

Cadre réservé au CNR

PATIENT

Nom (ou étiquette) :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe : F M

EXPÉDITEUR

Laboratoire :

Adresse complète :
(ou tampon)

Nom du biologiste :

Téléphone :

Mail :

SOUCHE ISOLÉE DE :

Type de prélèvement :

Date de prélèvement :

Votre référence dossier :

Espèce identifiée :

PRESCRIPTEUR (si autre qu'expéditeur)

Nom :

Service :

Téléphone :

Mail :

DEMANDE D'ANALYSE(S) (à cocher impérativement)

DANS TOUS LES CAS, JOINDRE LES RÉSULTATS DE L'ANTIBIOTIQUE ET L'ENSEMBLE DES TESTS EFFECTUÉS

• Facteurs de virulence / identification :

Détection des gènes codant les toxines superantigéniques, les leucocidines dont la PVL et les exfoliatines

Recherche de lien de clonalité (*joindre courrier motivant la demande*)Identification d'espèce (*joindre résultats des tests déjà réalisés*)• Résistance aux antibiotiques (*joindre résultats de tous les tests déjà réalisés*)Détection des gènes *mecA/mecC*Détection de la résistance à la vancomycine ou teicoplanine (uniquement *S. aureus* avec CMI en microdilution > 2 mg/L)Détection et recherche du mécanisme de la résistance au linézolide (notamment espèces autres qu'*epidermidis* ou souches avec faible niveau de résistance)

Détection de la résistance à la daptomycine

Autres résistances ou CMI à déterminer (préciser) :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Infection nosocomiale

Infection communautaire

Portage

Contexte épidémique (*joindre courrier*)

Syndromes toxiniques cutanés

Éruption bulleuse généralisée
Impétigo bulleux localisé
Scarlatine

Infections nécrosantes

Furonculose
Récidivante
Pneumonie nécrosante
Leucopénie Hémoptysies

Autre type d'infection, préciser :

Choc toxique staphylococcique
Préciser les critères diagnostiques :

Hypotension systolique
Fièvre > ou = à 38,9°C
Rash diffus maculo-érythrodermique
suivi de desquamation

Associés à des manifestations :

| | | |
|---------------|-------------|--------------------------|
| Digestives | Musculaires | Hyperhémie des muqueuses |
| Rénales | Hépatiques | Hématologiques |
| Neurologiques | | |

Choc en période menstruelle

avec utilisation de tampon périodique
avec utilisation de coupe menstruelle