



HCL
HOSPICES CIVILS
DE LYON

**HÔPITAL
LOUIS
PRADEL**

**ALLAITEMENT/DON DE LAIT
ET CARDIOPATHIE CONGÉNITALE**

Vous attendez un bébé porteur d'une malformation cardiaque

La cardiopathie dont souffre votre enfant représente pour lui un facteur de risque de mauvaise tolérance digestive avec un risque accru d'entérocolite (inflammation grave de la muqueuse intestinale)¹.

Le lait maternel, et en priorité celui de la maman, est l'alimentation recommandée pour votre nouveau-né^{2,3}

L'alimentation est un élément très important dans la prise en charge de votre enfant après la naissance. En plus d'une alimentation particulièrement appropriée et mieux tolérée, assurant jusqu'à 6 mois un développement optimal, le lait maternel apporte des systèmes de défenses contre les infections. Ainsi il réduirait le risque d'entérocolite notamment en préopératoire⁴, protège les enfants des infections gastro-intestinales et, dans une moindre mesure, des infections respiratoires (y compris l'otite moyenne)⁵.

N'hésitez pas à nous solliciter rapidement, nous pouvons vous aider à optimiser la mise en place de votre lactation.

Aider les bébés porteurs d'une malformation cardiaque

Pour diverses raisons, certaines mamans ne peuvent allaiter ou couvrir les besoins de leur bébé.

Dans certaines indications, les enfants pourront alors bénéficier transitoirement du lait de donneuses fourni par le lactarium régional Auvergne-Rhône-Alpes.

Si vous avez trop de lait, vous pouvez les aider, en faisant un don.

**Renseignez-vous auprès du lactarium régional Auvergne-Rhône-Alpes :
04 72 00 41 43**

- 1 - Giovanna Mangili et al. *Feeding dysfunctions and failure to thrive in neonates with congenital heart diseases*, *La Pediatria Medica e Chirurgica* 2018
- 2 - Karpen HE. *Nutrition in cardiac newborns: evidence based guidelines for cardiac newborns*. *Clin Perinatol.* 2016;43:131-145
- 3 - Jessica A. Davis, *Human Milk and Infants With Congenital Heart Disease ; A Summary of Current Literature Supporting the Provision of Human Milk and Breastfeeding*
- 4 - Acacia Cognata et al. *Human Milk use in the Pre-Operative Period is Associated with Less Risk for Necrotizing Enterocolitis in Neonates with Complex Congenital Heart Disease*
- 5 - ANAES, *Allaitement maternel*, mai 2002

www.chu-lyon.fr

