



Pour plus d'informations, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce document est issu du travail d'un groupe d'experts.

Conception :

Dr Anne Radiguet, Dr Audrey Janoly-Dumenil
audrey.janoly-dumenil@chu-lyon.fr

Ressources documentaires utilisées :

- ANSM (www.ansm.sante.fr)
- HAS (www.has-sante.fr),
- THERIAQUE (www.theriaque.org)

Hôpital Henry Gabrielle
Service de médecine physique
et de réadaptation

20 Route de Vourles
69230 Saint-Genis-Laval

Contact : emmanuelle.carre@chu-lyon.fr

Ce document est destiné à vous apporter
les principaux conseils d'utilisation de votre médicament.
Il ne remplace pas la notice complète du médicament.

www.chu-lyon.fr



HCL
HOSPICES CIVILS
DE LYON

**HÔPITAL
HENRY
GABRIELLE**

**BIEN SE SOIGNER
APRÈS UN AVC ISCHÉMIQUE**
(TRAITEMENT DE PRÉVENTION SECONDAIRE)
CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE TRAITEMENT
PAR **ANTIAGRÉGANT PLAQUETTAIRE**

Acide acétylsalicylique ou ASPÉGIC®
100 ou 250 mg - Sachet

Acide acétylsalicylique ou ASPIRINE PROTECT®
100mg - Comprimé

Acétylsalicylate de DL-lysine ou KARDÉGIC®
75 ou 160 ou 300 mg - Sachet



À QUOI SERT VOTRE MÉDICAMENT ?

Ce médicament **contient de l'acide acétylsalicylique = aspirine**, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au **traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux**.

Ce médicament **fluidifie le sang** ; il est utilisé pour empêcher la formation de caillots et réduire le risque d'un autre accident vasculaire cérébral lié à un caillot (AVC ischémique).

COMMENT AGIT-IL ?

Par diminution de l'agrégation des plaquettes sanguines (petits éléments circulant dans le sang), **il diminue la formation de caillots de sang** à l'intérieur des vaisseaux sanguins.

COMMENT LE PRENDRE ?



Respectez la posologie prescrite par votre médecin.

Généralement : **1 sachet par jour à prendre à heure régulière**

Dissoudre le contenu du sachet dans un verre d'eau.



QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI DE VOTRE PRISE ?



Dans ce cas, prenez simplement la dose suivante au moment habituel.

Ne prenez pas de double dose.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES ?



– **Des troubles digestifs** (douleurs abdominales, nausées, maux d'estomac)



– **Des saignements** : du nez, des gencives

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE ?



Contactez votre médecin immédiatement si vous présentez un des symptômes suivants après la prise de ce médicament :



– **Saignement anormal par sa durée ou sa localisation** (selles noires, vomissements sanglants...)

– **Douleurs d'estomac**

– Crise d'asthme, gonflement du visage



– **Bourdonnements d'oreille, de maux de tête** (ces derniers signes pouvant être le signe d'un surdosage)



L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours.

N'augmentez jamais vous-même les doses.

– **Informez votre médecin traitant, chirurgien, anesthésiste ou simplement votre dentiste** de votre traitement au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé. Dans certains cas, votre traitement sera arrêté temporairement pour limiter le risque de saignement.

– **Il peut survenir des interactions entre votre traitement et d'autres médicaments**, en particulier des médicaments en vente libre (sans ordonnance).



– Demandez toujours **conseil à votre pharmacien ou médecin** (même dans des situations banales : mal de tête, mal de dos, douleurs dentaires...).

– Ce médicament ne doit pas être prescrit si vous avez un ulcère digestif, une allergie à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires, ou une maladie hémorragique.