



Pour plus d'informations, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce document est issu du travail d'un groupe d'experts.

Conception :

Dr Anne Radiguet, Dr Audrey Janoly-Dumenil
audrey.janoly-dumenil@chu-lyon.fr

Ressources documentaires utilisées :

- ANSM (www.ansm.sante.fr)
- HAS (www.has-sante.fr),
- THERIAQUE (www.theriaque.org)

Hôpital Henry Gabrielle
Service de médecine physique
et de réadaptation

20 Route de Vourles
69230 Saint-Genis-Laval

Contact : emmanuelle.carre@chu-lyon.fr

Ce document est destiné à vous apporter
les principaux conseils d'utilisation de votre médicament.
Il ne remplace pas la notice complète du médicament.

www.chu-lyon.fr



HCL
HOSPICES CIVILS
DE LYON

**HÔPITAL
HENRY
GABRIELLE**

BIEN SE SOIGNER APRÈS UN AVC (TRAITEMENT DE PRÉVENTION SECONDAIRE) CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE TRAITEMENT PAR INHIBITEUR DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC)

Périndopril ou COVERSYL® - Comprimé

Captopril ou LOPRIL® - Comprimé

Enalapril ou RENITEC® - Comprimé

Ramipril ou TRIATEC® - Comprimé

(Plusieurs dosages existent)

Parfois associé à un autre médicament dans une spécialité.
Par exemple : Périndopril - Indapamide



À QUOI SERT VOTRE MÉDICAMENT

En abaissant votre tension artérielle, ce médicament participe à la prévention du risque de récurrence d'un accident vasculaire cérébral.

COMMENT AGIT-IL ?

Il favorise une dilatation des vaisseaux sanguins permettant une diminution de la tension artérielle.

La mesure de la tension artérielle comprend :

- La pression artérielle systolique ou haute (PAS)
- La pression artérielle diastolique ou basse (PAD)

Votre médicament abaisse la PAS et la PAD. Votre médecin vous donnera les valeurs de PAS et PAD à atteindre.

COMMENT LE PRENDRE ?



Respectez la posologie prescrite par votre médecin.



- **Périndopril** : avalez le comprimé **le matin avant le repas (à jeun) avec un verre d'eau.**
- **Pour les autres IEC** : avalez le comprimé **avec un verre d'eau soit pendant soit en dehors des repas.**

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI DE VOTRE PRISE ?

Ne prenez pas de double dose.

Dans ce cas, prenez simplement la dose suivante au moment habituel.



QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES ?



- Maux de tête, fatigue, sensations vertigineuses
- **Hypotension** (pression artérielle anormalement basse)
- **Troubles digestifs** : nausées, diarrhées, crampes, altération du goût...
- **Toux sèche**

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE ?



Contactez votre médecin immédiatement si vous présentez un des symptômes suivants après la prise de ce médicament, car ils peuvent être graves :

- des éruptions cutanées, des démangeaisons, une rougeur cutanée
- un gonflement du visage, des lèvres, de la bouche
- une difficulté pour respirer



Il peut survenir des interactions entre votre traitement et d'autres médicaments, en particulier des médicaments en vente libre (sans ordonnance, par exemple les anti-inflammatoires).

Parlez-en à votre pharmacien ou médecin.

QUELLE SURVEILLANCE ?

Surveillez votre tension artérielle régulièrement.

En plus, votre médecin peut vous prescrire des examens biologiques pour surveiller votre fonction rénale (élimination de la créatinine) et votre potassium sanguin.

