



Pour plus d'informations, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce document est issu du travail d'un groupe d'experts.

**Conception :**

Dr Anne Radiguet, Dr Audrey Janoly-Dumenil  
audrey.janoly-dumenil@chu-lyon.fr

Ressources documentaires utilisées :

- ANSM (www.ansm.sante.fr)
- HAS (www.has-sante.fr),
- THERIAQUE (www.theriaque.org)

**Hôpital Henry Gabrielle**

Service de médecine physique  
et de réadaptation

20 Route de Vourles  
69230 Saint-Genis-Laval

Contact : emmanuelle.carre@chu-lyon.fr

Ce document destiné à vous apporter  
les principaux conseils d'utilisation de votre médicament.  
Il ne remplace pas la notice complète du médicament.

[www.chu-lyon.fr](http://www.chu-lyon.fr)



**HCL**  
HOSPICES CIVILS  
DE LYON

**HÔPITAL  
HENRY  
GABRIELLE**

**BIEN SE SOIGNER  
APRÈS UN AVC ISCHÉMIQUE**  
(TRAITEMENT DE PRÉVENTION SECONDAIRE)  
CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE TRAITEMENT  
PAR **ANTIAGRÉGANT PLAQUETTAIRE**

**Clopidogrel ou PLAVIX®**  
75 ou 300 mg - Comprimé



---

## À QUOI SERT VOTRE MÉDICAMENT ?

Clopidogrel ou PLAVIX® **fluidifie le sang**. Il est utilisé pour empêcher la formation de caillots et réduire le risque d'un autre accident vasculaire cérébral lié à un caillot (AVC ischémique).

---

## COMMENT AGIT-IL ?

Les **plaquettes sanguines** (petits éléments circulant dans le sang) **s'agglutinent les unes aux autres lors de la coagulation du sang**.

Clopidogrel ou PLAVIX® est un antiagrégant plaquettaire, il empêche les plaquettes de s'agglutiner et **réduit donc le risque de formation de caillot dans le sang (phénomène appelé thrombose)**.

---

## COMMENT LE PRENDRE ?



**Respectez la posologie prescrite par votre médecin.**

1 comprimé par jour

– Avalez le comprimé chaque jour à **heure régulière avec un verre d'eau pendant ou en dehors d'un repas**.



---

## QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI DE VOTRE PRISE ?



– **Moins de 12h** par rapport à l'horaire prévu : **prenez votre comprimé**.



– **Plus de 12h** par rapport à l'horaire prévu : dans ce cas, prenez simplement la dose suivante au moment habituel.

**Ne prenez pas de double dose.**

---

## QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES ?



– Des **troubles digestifs** (douleurs abdominales, diarrhées, digestion difficile...)

– Des hématomes cutanés



– Des **saignements** : du nez, digestifs, du sang dans les urines ou selles...

---

## QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE ?



**Contactez votre médecin immédiatement** face à **tout saignement anormal par sa durée ou sa localisation** (selles noires, vomissements sanglants...).

– **Informez votre médecin traitant, chirurgien, anesthésiste** ou simplement votre **dentiste** de votre traitement au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé. Dans certains cas, votre traitement sera arrêté temporairement pour limiter le risque de saignement.

– Il peut **survenir des interactions entre votre traitement et d'autres médicaments**, en particulier des médicaments en vente libre (sans ordonnance).



**Demandez toujours conseil à votre pharmacien ou médecin**, même dans des situations banales : mal de tête, mal de dos, douleurs dentaires.

Ce médicament n'est pas prescrit si vous avez un ulcère digestif, une maladie hémorragique, ou certains troubles du foie.