

Ce livret a été élaboré par le Dr E. CARRE (pharmacien), le Dr T. DANAILA (neurologue) et P. BLONDEL (étudiante en pharmacie) à l'aide des documents issus du programme ETPPARK du CHU de Toulouse.




Hôpital Henry Gabrielle
Service de médecine physique
et de réadaptation

20 route de Vourles
69230 Saint-Genis-Laval

Hôpital Pierre Wertheimer
Centre Expert Parkinson

59 Boulevard Pinel
69500 Bron

www.chu-lyon.fr



HCL
HOSPICES CIVILS
DE LYON

MALADIE DE PARKINSON

MON TRAITEMENT PAR AGONISTES DOPAMINERGIQUES

REQUIP®/REQUIP® LP ROPINIROLE – SIFROL®/SIFROL® LP PRAMIPEXOLE
NEUPRO® ROTIGOTINE – APOKINON® APOMORPHINE
TRIVASTAL® /TRIVASTAL® LP PIRIBÉDIL – PARLODEL® BROMOCRIPTINE
OPRYMEA® /OPRYMEA® LP PRAMIPEXOLE – DOPACEPTIN® APOMORPHINE


■ DE QUOI EST COMPOSÉ MON MÉDICAMENT ?

Un agoniste dopaminergique est une substance active ayant une structure proche de la dopamine et fonctionnant de la même façon.

■ À QUOI SERT MON MÉDICAMENT ?

À l'état physiologique, la dopamine libérée par le **neurone pré-synaptique se fixe aux récepteurs à dopamine du neurone post-synaptique.**

Les agonistes **miment l'action de la dopamine** donc ils diminuent eux aussi l'intensité des tremblements, de la rigidité et de l'akinésie



■ COMMENT AGIT-IL ?

Les agonistes dopaminergiques se **fixent sur les récepteurs à dopamine**, entraînant ainsi leur **activation**.

■ COMMENT LE PRENDRE ?

- Respectez la **prescription** : posologie, intervalle entre chaque prise.
- Respectez la **forme du médicament** : ne pas croquer, ouvrir ou écraser (sauf si le neurologue ou le pharmacien vous autorise à le faire).
- En cas de **difficultés à avaler** le comprimé avec de l'eau, privilégiez la compote, le yaourt ou la confiture.
- La **prise à distance des repas** (½ heure avant) est **recommandée**. Le médicament peut être pris pendant les repas, s'il provoque des troubles digestifs.

■ QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

- Ne prenez pas de double dose.
- Prenez la prise oubliée et ne changez pas les modalités de la prise suivante.

■ QUELS SONT LES PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES ?

- **Troubles digestifs** : nausées, vomissements, constipation
- **Troubles de la vigilance** : somnolence
- **Troubles du comportement** : addictions (au jeu, au sexe, achats compulsifs, grignotage...)

- **Troubles psychiques** : hallucinations, anxiété
- **Troubles cardiovasculaires** : hypotension, malaise, œdèmes
- **Troubles moteurs** : dyskinésies, douleurs musculaires

■ QUELS MÉDICAMENTS SONT DÉCONSEILLÉS AVEC MON TRAITEMENT ?

- Les **médicaments hypotenseurs** : majoration de l'hypotension
- Les **médicaments ayant une action sur le système nerveux central** : antipsychotiques, neuroleptiques, sédatifs, antidépresseurs, psychotropes
- Les **médicaments antiémétiques** : Métoclopramide (PRIMPERAN®)

■ QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE ?

- **Signalez la prise de votre traitement à tous les professionnels de santé** car certains médicaments interagissent avec votre traitement.
- **Demandez conseil à votre pharmacien ou médecin**, même dans des situations banales: maux de ventre, maux de tête, douleurs musculaires...
- **Signalez tous les effets indésirables et/ou symptômes nouveaux** que vous ressentez à la prise du traitement à votre neurologue (**en particulier les comportements addictifs**).
- **Discutez de la conduite automobile** avec votre neurologue **et soyez vigilant** lors de la prise de votre véhicule (possible altération de la conduite).
- A l'initiation du traitement, **contrôlez votre tension**.
- Réalisez **une surveillance ophtalmologique régulière**.

■ CONSEILS D'UTILISATION

Pour **NEUPRO®** :

- Choisissez **une zone de pose sèche et sans frottement**.
- En cas d'**IRM**, retirez le patch.
- En cas de **décollement du patch** (même partiel), **posez-en un nouveau** (si besoin demandez au médecin de prescrire une boîte de plus sur l'ordonnance).
- En cas de **douche/baignade**, retirer le patch puis une fois sortie de l'eau reposer un nouveau patch.

Pour **APOKINON®** :

- **Variez les sites d'injections**.